



Lycoperdon dermoxanthum

Vittad.

DESCRIPTION

Nom Latin : *Lycoperdon dermoxanthum* Vittad.

Nom Français : Vesse-de-loup naine

Current name : *Holocotylon dermoxanthum* (Vittad.) R.L. Zhao & J.Xin Li, *Mycosphere* 15 (1): 4990 (2024) [MB#571810] MB#613349

Basionym : *Lycoperdon dermoxanthum* Vittad., *Mem. Accad. Torino Ser. 2*, 5: 34 (1842) [MB#232356] MB#163626

Homotypic synonym(s) :

Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni, *Syll. Fung.* 7 (1): 100 (1888) [MB#202756] MB#163625

Globaria dermoxantha (Vittad.) Quéél, *Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci.* 13 (2): 283 (1885) [MB#507771] MB#437346

Heterotypic synonym(s) :

Holocotylon brandegeeanum Lloyd, *Mycol. Writ.* 2 (21): 254 (1906) [MB#241659] MB#245620

Taxonomie :

Division : Basidiomycota

Sous-division : Agaricomycotina

Classe : Agaricomycetes

Sous-classe : Incertain

Ordre : Agaricales

Sous-ordre : Agaricineae

Famille : Agaricaceae

Genre : *Lycoperdon*

Basidiome

0,7-2 cm de diam., petit, globuleux à ovoïde, sessile, fixé au substrat en permanence par un rhizomorphe distinct, à exopéridium furfuracé à finement granuleux, vite fragmenté en flocons fugaces, donnant des plaques aréolées rappelant la mousse de savon séchée, blanc puis chamois et brun terne à brun olive

Sac sporifère

Endopéridium farineux, luisant, pâle, s'ouvrant par un pore apical, sans sous-glèbe

Glèbe

ferme et blanche au début, puis jaune pâle à brun olive, poudreuse et brun foncé à brun grisâtre à maturité

Capillitium

Formé de filaments de type *Lycoperdon*, fragiles, plutôt tordus, atténués vers l'apex, à paroi épaissie, porés chez les plus larges, jaune-brun dans le KOH, 2,5-6 µm de diam.